

* 2015年2月改訂

日本標準商品分類番号 872649

貯法等 保存条件：室温保存
容 器：密閉容器

承認番号 16100AMZ01623000
薬価基準収載
販売開始 1973年2月
再評価結果 1979年2月

局所収れん・保護剤

日本薬局方 亜鉛華デンプン

* 亜鉛華デンプン「ヤマゼン」M

【禁忌】（次の部位には使用しないこと）

- (1) 重度又は広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある〕
- (2) 患部が湿潤している場合〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある〕

【組成・性状】

組成：本品 100g 中、下記成分・分量を含有する。

日局 酸化亜鉛 50g
賦形剤 日局 バレイショデンプン 50g

性状：本品は白色の粉末である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩やかな防腐
湿疹、皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、綿などに含ませて軽く散布して用いる。

【使用上の注意】

1. 副作用（頻度不明）

- (1) 過敏症 過敏症があらわれた場合には使用を中止する。
- (2) 皮膚 発疹・刺激感等の症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- (1) 誤って吸入しないよう注意すること。
- (2) 眼には使用しないこと。
- (3) 湿潤性病変には適さないので、使用を避けること〔デンプンの保湿作用により、患部を悪化させることがある〕。

【薬効薬理】

- (1) 酸化亜鉛は皮膚のタンパク質と結合して皮膜を形成し、収れん、消炎、保護並びに緩やかな防腐作用を現す。
- (2) デンプンは浸出液の吸収及び分泌抑制により、創面又は潰瘍面等を乾燥させる。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：酸化亜鉛 (Zinc Oxide)

分子式：ZnO

分子量：81.39

性状：白色の無晶性の粉末でにおい及び味はない。水、氷酢酸、エタノール又はエーテルにほとんど溶けず、希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。
空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【包装】 500g

【主要文献】 日本薬局方解説書

【文献請求先】 山善製薬株式会社 学術室 TEL06-6231-1821 FAX06-6231-1824
〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番4号

製造販売元

 **山善製薬株式会社**
大阪市中央区道修町2丁目2番4号

