

貯法等 保存条件：室温保存
容 器：気密容器
「取扱い上の注意」参照
使用期限：外箱に記載

人工カルルス塩「ヤマゼン」

【禁忌】 (次の患者には投与しないこと)

- (1) 急性腹症が疑われる患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
- (2) 重症の硬結便のある患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
- (3) うっ血性心不全・浮腫のある心疾患の患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
- (4) ナトリウム摂取の制限を必要とする患者(高ナトリウム血症、浮腫、妊娠中毒症等)〔ナトリウム貯留増加により、症状が増悪するおそれがある。〕

【組成・性状】

組成：本品100g中、下記成分・分量を含有する。

	乾燥硫酸ナトリウム	44 g
日局	炭酸水素ナトリウム	36 g
日局	塩化ナトリウム	18 g
日局	硫酸カリウム	2 g

性状：本品は白色で、水に溶けやすく、酸類を加えると激しくあわだつ。

【効能・効果】

便秘症

【用法・用量】

通常成人1回5g、1日15gを振盪合剤として経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 腎障害のある患者〔ナトリウム貯留による浮腫があらわれるおそれがある。〕
- (2) 心機能障害のある患者〔循環血液量が増すことにより心機能負担が増大するおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

腎機能障害のある患者には長期投与しないこと。

3. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種 類	頻 度	頻 度 不 明
消 化 器		悪心、腹痛等
長期・大量投与 ^{注)}		腎障害、心機能障害、腸のぜん動不全

注) 大量投与を避け、また、数日間の投与にとどめること。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、減量するなど注意すること。

5. 産婦・妊婦・授乳婦等への投与

子宮収縮を誘発して流産の危険性があるので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には大量投与を避けること。

6. 小児等への投与

電解質異常等の副作用があらわれやすいので、小児には投与しないことが望ましい。

【薬効薬理】

硫酸ナトリウムなどの下剤は長期服用すると消化不良を起こしやすく、かえってがんこな便秘を起こすこともあるが、炭酸水素ナトリウムの配合により腸内のアルカリ欠乏を起こさなくし、連用による害を妨いでいる。

【有効成分に関する理化学的知見】

- | | |
|--|--|
| (1) 乾燥硫酸ナトリウム
一般名：硫酸ナトリウム
化学名：Sodium Sulfate
分子式：Na ₂ SO ₄ 分子量：142.04 | (3) 塩化ナトリウム
一般名：塩化ナトリウム
化学名：Sodium Chloride
分子式：NaCl 分子量：58.44 |
| (2) 炭酸水素ナトリウム
一般名：炭酸水素ナトリウム
化学名：Sodium Bicarbonate
分子式：NaHCO ₃ 分子量：84.01 | (4) 硫酸カリウム
一般名：硫酸カリウム
化学名：Potassium Sulfate
分子式：K ₂ SO ₄ 分子量：174.26 |

【取扱い上の注意】 本品は吸湿すると変化して溶解しにくくなるので、防湿して保存すること。

【包 装】 500g

【主要文献】 日本薬局方解説書

【文献請求先】 山善製薬株式会社 学術室 TEL06-6231-1821 FAX06-6231-1824
〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番4号

製造販売元

 **山善製薬株式会社**
大阪市中央区道修町2丁目2番4号

